

CIRUGÍA DE MEJILLAS

Objetivo:

Cirugía plástica que permite afinar las mejillas logrando resaltar la imagen de los pómulos y definir el reborde mandibular produciendo un afinamiento del rostro.

Las **bolas o bolsas de Bichat** son un par de bolsas constituidas de grasa que se encuentran en la zona de las mejillas (se encuentran en todas las personas entre el músculo masetero y el músculo bucinador, en el sector medio de las mejillas a ambos lados de la cara), con un volumen normal de aprox. 10 CC. No obstante, con todo y su pequeño tamaño, estas bolsas de grasa son las que configuran el espacio de la zona media e inferior del rostro dándole al mismo un aspecto más redondeado.


Al retirar las bolas de Bichat, logramos tener un efecto de rejuvenecimiento muy marcado, acoplando los deseos de mejorar la calidad jovial del rostro, en unos minutos. Tras la técnica bichectomía se va consiguiendo un excelente aspecto estético, dejando a la vista una amplia armonía facial.

¿Quiénes pueden realizárselas?


- Cuando se desea resaltar o marcar más los pómulos.
- Cuando sus bolas de bichat son grandes.


















BICHETOMÍA



- Cuando se busca dar al rostro un aspecto más juvenil.
- Cuando las bolsas de grasa de las mejillas dan una apariencia de sobrepeso sin tenerlo.

¿Cómo la realizamos?

Se realiza en el quirófano con anestesia local, realizando una incisión dentro de la boca para así extraer las bolsas grasas (bolsas de Bichat) ubicadas en cada lado, y tiene una duración aproximada de 1 hora, cirugía ambulatoria.

La extracción de las bolsas de Bichat es un método reversible, dado q si el paciente disminuye mucho de peso y el rostro se visualiza muy delgado o se arrepiente, se puede volver a colocar grasa extrayéndola de otra parte del cuerpo.

Post-operatorio.

Como la cirugía es con anestesia local podrá retirarse ni bien termina la cirugía; deberá realizar 24 horas de reposo, al otro día podrá reanudar su tarea social y/o laboral; evitar por una semana alimentos duros; evitar por 7-15 días realizar ejercicios físicos intensos.

Resultados.

Comenzarán a notarse al mes de la cirugía, dado que habrá edemas y/o hematomas

Contacta con nosotros ahora.







