

CIRUGÍA ÍNTIMA - VAGINOPLASTIA

La hipertrofia de los labios menores consiste en que los labios menores (los más internos) sobrepasan a los labios mayores (los más externos). Esto puede provocar irritación y molestias en las relaciones sexuales, en el uso de prendas ajustadas o en la práctica de determinados deportes.

Causas.

Las causas más frecuentes son: predisposición genética, parto vaginal o envejecimiento. La labioplastia es una intervención quirúrgica ambulatoria, que se realiza bajo anestesia local y/o sedación y una de las más frecuentes como cirugía íntima.

En la consulta.

Se evaluará tu estado general, los depósitos de grasa existentes y el tono y firmeza de la piel. Una vez realizada esta evaluación, se te mostrarán las alternativas disponibles y se te recomendará, personal e individualmente, la técnica quirúrgica más adecuada según tu anatomía, aclarando todas las dudas que puedan surgir.

Postcirugía.

Durante el primer mes, deberá usar ropa interior cómoda de algodón y evitar prendas ajustadas. Las sensaciones extrañas en la piel y el edema más importante disminuirán en tres semanas aproximadamente.







VAGINOPLASTIA





Edad: cuando esté indicada por el profesional.

Duración: 45-60 minutos

Anestesia: local y/o sedación (si lo requiere).

Postoperatorio: 7 días aprox. y 45 días aprox. para retomar actividad

sexual.

Resultado final: 1 mes.

Estudios prequirúrgicos: análisis de sangre, electrocardiograma.

Estables emocionalmente.




Si estás considerando una vaginoplastia para mejorar tu comodidad y bienestar, agenda una consulta con el Dr. Guillermo Di Biasio. Con su experiencia y enfoque personalizado, encontrarás la mejor solución para tus necesidades específicas. ¡Recupera tu confianza y comodidad! Contáctanos hoy mismo para programar tu cita.











info@guillermodibiasio.com.ar





