

LIFTING DE MUSLOS



DERMOLIPECTOMÍA DE MUSLOS O CRURAL

¿Qué es el lifting de muslos?

El lifting de muslos consiste en la reducción de muslos y comprende una variedad de operaciones que eliminan la piel y la grasa de la cara interna de la pierna (el muslo) con el fin de mejorar la silueta, generalmente suele darse después de una gran pérdida de peso o como consecuencia del descolgamiento que sufren esos tejidos con el paso de los años.

Duración de la cirugía

La cirugía tiene una duración de dos a cuatro horas y media, dependiendo de la cantidad de tejido a eliminar. Normalmente, requiere un cambio de posición (de la parte anterior a la posterior y viceversa) y volver a preparar el campo quirúrgico y al paciente cada vez que se realiza un cambio de postura.

Cicatrices.


El método de realizar la tracción de la piel del muslo depende de su anatomía, del exceso cutáneo y de nuestras recomendaciones. La incisión puede ser hecha sólo en la cara posteromedial del muslo o puede ser necesario prolongarla hasta el pliegue glúteo.



LIFTING DE MUSLOS



No olvide que las incisiones serán proporcionales a la cantidad de piel sobrante, y que para eliminar ésta no hay otra forma posible que realizar cicatrices. La elección se hace con el objetivo de que la incisión este colocada de forma que la cicatrices sean lo menos visibles posible. A través de la incisión realizamos una liposucción para facilitar la tracción de la piel y así además mejoramos el contorno, a continuación, eliminamos la piel sobrante. Después las incisiones se suturan con precisión. Se dejan drenajes durante 24/48 hs. tras la cirugía. Es importante discutir pros y contras de cada una de las técnicas para que entienda las implicaciones del procedimiento que le recomendamos.



Cicatriz

Resección de piel

Incisión

Liposucción de grasa



LIFTING DE MUSLOS



Día de la cirugía.

Durante el día de la operación es preciso que lo/a acompañe un adulto responsable. Y del mismo modo que alguien le ayude en su vida habitual durante los primeros días, hasta que se recupere y pueda desenvolverse por sí mismo/a. Puede ser una cirugía ambulatoria o con ingreso hospitalario dependerá del estado/evaluación del paciente.

Postcirugía.

Es normal notar cansancio y molestias durante algunos días tras la intervención. La mayor parte de estas molestias disminuyen con la medicación.

Deberá estar en reposo uno o dos días, sin someter a tensión las suturas. Podrá hacer una vida normal sin excesivas tensiones al cabo de una semana.

En dos o tres días le retiraremos los drenajes.

Las sensaciones extrañas en la piel y el edema más importante disminuirán en más o menos tres semanas.

Las suturas serán retiradas aproximadamente en dos semanas. Pero el muslo tardará algunas semanas más en recuperar su aspecto completamente normal.

Podrá volver a su trabajo en unos quince días dependiendo del nivel de actividad que requiera el mismo.

Siga nuestros consejos sobre cuando comenzar a realizar ejercicio y actividad normal.

Sus piernas probablemente estarán más sensibles a la estimulación directa en dos o tres semanas, de forma que debe evitar el contacto físico. Después progresivamente volverán al estado normal.

Las cicatrices estarán endurecidas y rosadas al menos durante seis semanas (no obstante, este endurecimiento puede durar algunos meses). Después progresivamente se irán atenuando hasta hacerse muy poco evidentes.



LIFTING DE MUSLOS



Riesgos

El más común es la dehiscencia (abertura) de la herida en la intersección de las líneas de sutura en la ingle, a causa de la excesiva tirantez del cierre del muslo provocada por un movimiento inapropiado del paciente. Pueden darse cicatrices ensanchadas por la tensión excesiva en dichas zonas. Además, están los riesgos inherentes a cualquier acto quirúrgico: hematoma, infección, alteraciones de la sensibilidad de la zona intervenida, entre otros.

Ficha técnica:

Duración: 2 a 4,30hs de cirugía.

Anestesia: local con sedación o general

Postoperatorio: 20 días, para la práctica de deportes
aprox. 30 días.

Resultado final: 3 a 6 meses.

Estudios prequirúrgicos: análisis de sangre,
electrocardiograma, psicoprofilaxis quirúrgica en
algunos casos.

Estable emocionalmente

Contáctate con nosotros ahora.

